



**PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 2938/2024**

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2024.

Processo nº 0811492-08.2024.8.19.0002,  
ajuizado por -----

O presente parecer visa atender à solicitação de informações técnicas do **5º Juizado Especial de Fazenda Pública** da Comarca de Niterói do Estado do Rio de Janeiro quanto ao medicamento **cloridrato de duloxetina 30mg** (Velija®).

**I – RELATÓRIO**

1. Resgata-se PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 1502/2024 (Num. 115955500), emitido em 29 de abril de 2024, no qual foram prestados os esclarecimentos acerca do pleito **cloridrato de duloxetina 30mg** (Velija®).
2. Em novo laudo (Num. 130248321 - Págs. 2/3), de 05 de julho de 2024, a médica ----- informou que a Autora *apresenta cefaleia de longa data e apresenta também disfunção de articulação temporomandibular, já fez uso de vários medicamentos e teve resposta parcial das dores, além do mais ela é muito ansiosa. A introdução do cloridrato de duloxetina 30mg à noite está sendo feita no intuito de ajudar no controle da dor crônica e do seu quadro de ansiedade.*

**II – ANÁLISE**

**DA LEGISLAÇÃO/ DO PLEITO**

1. Conforme abordado em PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 1502/2024 (Num. 115955500), emitido em 29 de abril de 2024.

**DO QUADRO CLÍNICO**

1. Em complemento ao PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 1502/2024 (Num. 115955500), emitido em 29 de abril de 2024.
2. A disfunção de articulação temporomandibular é responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca; é o encaixe da mandíbula com o resto dos ossos do crânio. É uma das articulações mais complexas do corpo humano. Para localizá-la, posicione seus dedos logo em frente das orelhas, abra e feche a boca e você sentirá as articulações temporomandibulares, uma de cada lado do rosto, movimentarem-se sob seus dedos. A disfunção da ATM é uma anormalidade da articulação temporomandibular e/ou dos músculos responsáveis pela mastigação. Sintomas mais comuns da disfunção da ATM são dores de cabeça na região da testa, fundo de olho e nas têmporas; dores de ouvido; zumbidos no ouvido; dificuldade para mastigar, principalmente alimentos duros; dores durante a mastigação; tonturas; vertigens; barulho próximo à orelha ao abrir e fechar a boca; desgaste dental excessivo; sensação de travar a mandíbula<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup> Biblioteca virtual em saúde – Ministério da Saúde. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/disfuncao-da-articulacao-temporomandibular-atm/>>. Acesso em: 29 jul. 2024.



3. No transtorno de **Ansiedade**, as manifestações clínicas oscilam ao longo do tempo, mas não ocorrem na forma de ataques, nem se relacionam com situações determinadas. Estão presentes na maioria dos dias e por longos períodos, de muitos meses ou anos. O sintoma principal é a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada, mórbida. Além disso, há inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia e sudorese<sup>3</sup>.

### **III – CONCLUSÃO**

1. De acordo com o teor conclusivo do PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 1502/2024 (Num. 115955500), este Núcleo solicitou: (i) ao médico assistente a emissão de novo documento com descrição do quadro clínico completo da Autora para que esse Núcleo pudesse inferir, de forma técnica e segura, a respeito da indicação do **cloridrato de duloxetina 30mg** (Velija®) e (ii) avaliação médica acerca do uso dos medicamentos padronizados no SUS ou emissão de novo laudo com justificativa de cunho técnico e científico acerca de impossibilidade de seu uso em consonância com as diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde para o tratamento da dor crônica.

2. Por conseguinte, novo documento médico foi acostado aos autos (Num. 130248321 - Págs. 2/3), no qual a médica assistente afirmou que o medicamento **cloridrato de duloxetina 30mg** (Velija®) está sendo feito no intuito de ajudar no controle da dor crônica secundária a disfunção de articulação temporomandibular e do seu quadro de ansiedade.

3. Diante o exposto, ressalta-se que o medicamento **cloridrato de duloxetina 30mg** (Velija®) está indicado no tratamento do quadro clínico apresentado pela Autora.

4. Em relação ao uso dos medicamentos padronizados no SUS para o manejo da dor crônica, a médica relata que a Autora *já fez uso de vários medicamentos e teve resposta parcial das dores*. Portanto, a médica assistente que acompanha a Autora entende que os demais medicamentos padronizados no SUS não são uma opção para o caso em tela.

5. Ressalta-se que as informações sobre o fornecimento pelo SUS do medicamento aqui pleiteado já foram devidamente prestadas em parecer técnico anterior.

**É o parecer.**

**Ao 5º Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Niterói do Estado do Rio de Janeiro para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.**

**JACQUELINE ZAMBONI MEDEIROS**  
Farmacêutica  
CRF/RJ 6485  
ID: 50133977

**FLÁVIO AFONSO BADARÓ**  
Assessor-chefe  
CRF-RJ 10.277  
ID. 436.475-02

<sup>2</sup> BVS Atenção Primária em Saúde. Disponível em: <<https://aps-repo.bvs.br/aps/como-diagnosticar-e-tratar-disfuncao-de-articulacao-temporomandibular/>>. Acesso em: 29 jul. 2024.

<sup>3</sup> Associação Brasileira de Psiquiatria. Transtornos de Ansiedade: Diagnóstico e Tratamento. Projeto Diretrizes, 2008. Disponível em: <<https://psiquiatriabh.com.br/wp/wp-content/uploads/2015/01/Projeto-Diretrizes-Transtornos-de-ansiedade.pdf>>. Acesso em: 29 jul. 2024.